



De los dos robles más abundantes, el rebollo (*Quercus pyrenaica*) coloniza preferentemente los suelos más ácidos (el monte de Orbaneja y Cardañuela), y el quejigo los calizos (Olmos y Quintanapalla).



El pino negral o laricio (*Pinus nigra*) ha sido la especie más utilizada en las repoblaciones de este territorio, tal vez por medrar bien sobre suelos calizos.



arce menor (*Acer campestre*).



encina (*Quercus ilex rotundifolia*).



geranio silvestre (*Geranium pyrenaicum*).




narciso de monte (*Narcissus asturiensis*).



Cuando frotamos la hierba de ajo (*Alliaria petiolata*) desprende su característico olor a ajo.




quejigo (*Quercus faginea*).



malva o panecillos (*Malva sylvestris*).



achicoria silvestre (*Cichorium intybus*).



El aciano o azulete (*Centaura cyanus*), que crece en los ribazos, es cada vez más escaso por el uso de herbicidas.

El sauce blanco (*Salix alba*) es el sauce más majestuoso, encontrando todavía en algunos puntos ejemplares de magníficas proporciones.



fresno de Castilla (*Fraxinus angustifolia*).



El espino o majuelo (*Crataegus monogyna*) es la especie más relevante de la comarca. Este arbusto, empleado a lo largo de los siglos como separación de fincas, proporciona alimento y protección a la fauna. A pesar de la concentración parcelaria, todavía quedan ejemplares añosos.



cebadilla de ratón (*Hordeum murinum*).



orquídea (*Ophrys tenthredinifera*).

El salcegado o sauce ceniciento (*Salix atrocinerea*) es la especie más abundante de nuestros ríos.



sarga (*Salix eleagnos*).



bardaguera blanca (*Salix salviifolia*).

El sauce rojo (*Salix purpurea*), como las demás especies de ribera, es fundamental para proteger ríos y arroyos: frenan la erosión y controlan con su sombra la proliferación de plantas, evitando así desbordamientos por el taponamiento del cauce. Además, son la opción más eficaz y barata para fijar las orillas.



Hoja en otoño de chopo o álamo negro (*Populus nigra*).



rosál silvestre (*Rosa canina*).



La lantana (*Viburnum lantana*) es un arbusto frecuente en nuestros quejigares.



saúco (*Sambucus nigra*).



El muérdago (*Viscum album*) es una planta parásita que debilita chopos, sauces, espinos, pinos, etc. Los pájaros dispersan sus frutillos pegajosos involuntariamente.



La aulaga o aliaga (*Genista scorpius*) está adaptada para sobrevivir al pastoreo y a los fuegos ganaderos.



acigüembre o uva espina (*Ribes uva-crispa*).



MANCOMUNIDAD Encuentro de Caminos SIERRA DE ATAPUERCA CAMINO DE SANTIAGO VÍA ROMANA Burgos